

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ Α:

A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

1. Κατά τη διάδοση ενός κύματος μέσα σ'ένα ελαστικό μέσο, έχουμε μεταφορά:
 - a. ορμής και ενέργειας
 - β. ύλης και ενέργειας
 - γ. ορμής και ύλης
 - δ. ορμής, ύλης και ενέργειας.

(Μονάδες 3)

2. Η σχέση που συνδέει την ταχύτητα διάδοσης v , το μήκος κύματος λ και την περίοδο T ενός κύματος είναι:

$$a. v = \lambda \cdot T \quad \beta. v = \frac{\lambda}{T} \quad \gamma. \lambda = \frac{v}{T} \quad \delta. T = v \cdot \lambda$$

(Μονάδες 3)

3. Η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος εξαρτάται από:

- a. τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης.
- β. τη συχνότητα της πηγής του κύματος.
- γ. τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος
- δ. τη συχνότητα της πηγής και τις ιδιότητες του μέσου.

(Μονάδες 3)

4. Η απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ενός σημείου του ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται ένα κύμα εξαρτάται μόνο:

- a. από την απόσταση του σημείου από την πηγή.
- β. από την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.
- γ. από την απόσταση του σημείου από την πηγή και το χρόνο.
- δ. από κανέναν από τους παραπάνω παράγοντες, αφού όλα τα σημεία έχουν ίδια απομάκρυνση κάθε στιγμή.

(Μονάδες 3)

5. Κατά την διάδοση των κυμάτων ισχύει ότι:

- a. τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά.
- β. τα διαμήκη κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά.
- γ. στα εγκάρσια κύματα, η διεύθυνση διάδοσης ταυτίζεται με τη διεύθυνση ταλάντωσης των μορίων του ελαστικού μέσου.
- δ. η ταχύτητα ταλάντωσης των μορίων είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.


(Μονάδες 3)




ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687

- B. Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε το στιγμιότυπο ενός τρέχοντος αρμονικού σχήματος. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές ή λάθος:

1. Τα σημεία Α και Γ απέχουν απόσταση λ .
 2. Τα σημεία Α και Δ απέχουν απόσταση $\lambda/2$.
 3. Τα σημεία Α, Ε είναι κάποια από τα σημεία που έχουν αυτή τη στιγμή ταχύτητα ίση με μηδέν.
 4. Η χρονική στιγμή του παραπάνω στιγμιούπου είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του $\frac{T}{2}$
- $$\left(t_1 = k \frac{T}{2} \right).$$
5. Τη χρονική στιγμή t_1 , η φάση του σημείου Π είναι μηδέν.



(Μονάδες 2x5)



ΘΕΜΑ Β:

- A. Να αποδείξετε την εξίσωση ενός αρμονικού κύματος που διαδίδεται κατά τη θετική φορά του άξονα x' και που παράγεται από πηγή που βρίσκεται στη θέση $x=0$ και εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση με εξίσωση $y = Aημωτ$.

(Μονάδες 10)

- B. Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά τη θετική φορά του άξονα xx' . Δύο σημεία A και B του ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται το κύμα έχουν μιά ορισμένη χρονική στιγμή t_1 φάσεις: $\varphi_A = \frac{11\pi}{6}$ και $\varphi_B = \frac{4\pi}{3}$ αντίστοιχα.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές ή λάθος, εξηγώντας ταυτόχρονα και το γιατί:

1. Το κύμα διαδίδεται με φορά από το A στο B.

(Μονάδες 5)

2. Η απόσταση (AB) ισούται με $\frac{\lambda}{3}$ (όπου λ το μήκος κύματος).

(Μονάδες 4)

3. Η πηγή O εκείνη τη στιγμή έχει φάση $\varphi_B < \varphi_0 < \varphi_A$

(Μονάδες 3)


4. Οι φάσεις των σημείων A και B μια μεταγενέστερη χρονική στιγμή θα έχουν μεγαλώσει σε σχέση με τις τιμές τους τη χρονική στιγμή t_1 .

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ Γ:

Στο σχήμα βλέπουμε το στιγμιότυπο ενός κύματος τη χρονική στιγμή $t_1 = 1s$. Το κύμα διαδίδεται κατά τη θετική φορά του άξονα xx' . Να βρεθούν:

- a. Η εξίσωση της κίνησης της πηγής και η εξίσωση του διαδιδόμενου κύματος.



(Μονάδες 8)

- b. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος και η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σημείων του ελαστικού μέσου.

(Μονάδες 5)

- γ. Στο παραπάνω στιγμιότυπο να βρεθούν οι επιταχύνσεις των σημείων M με $x_M = 5m$ και B με $x_B = 11m$. Δίνεται: $\pi^2 = 10$

(Μονάδες 7)

- δ. Αν η πηγή είχε αρχική φάση $\phi_0 = \pi$, ποιό θα ήταν το στιγμιότυπο του κύματος την ίδια στιγμή t_1 ;

(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Δ:



Ένα σημείο O ενός ελαστικού μέσου αρχίζει τη χρονική στιγμή $t = 0$ να εκτελεί γ.α.τ. με πλάτος $A = 0,4m$. Έτσι παράγεται ένα αρμονικό κύμα, το οποίο διαδίδεται κατά τη θετική φορά του άξονα xx' . Μετρώντας, βρίσκουμε ότι πέντε διαδοχικά όρη απέχουν μεταξύ τους $d = 20m$ και ότι ένα σημείο του ελαστικού μέσου χρειάζεται $\Delta t = 0,5s$ για να μεταβεί από τη θέση ισορροπίας του στη θέση όπου $y = A$. Αν στο σημείο O θεωρήσουμε ότι $x = 0$:

- a. Να βρείτε την εξίσωση του διαδιδόμενου κύματος.

(Μονάδες 10)

- β. Ένα σημείο M του ελαστικού μέσου M έχει $x_M = 6,25m$

- i. Να υπολογίσετε την απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας του τις χρονικές στιγμές $t_1 = 2s$ και $t_2 = 3s$.

(Μονάδες 6)

- ii. Να υπολογίσετε τη διαφορά φάσης του με την πηγή. Είναι σταθερή ή όχι;

(Μονάδες 4)

- iii. Πόσο απέχουν από την πηγή τα σημεία που έχουν με το M διαφορά φάσης $\Delta\phi = \frac{\pi}{2}$.

(Μονάδες 5)